

Die Aussaat und die Entwicklung des Sommergetreides sind regional sehr unterschiedlich vorangeschritten. Sehr früh gedrillte Bestände befinden sich bereits in der Bestockung. Spätere Bestände erreichen aktuell das 2-Blattstadium. Bei geplanten Herbizidmaßnahmen gilt es schlagspezifisch das richtige Timing zu finden. Der Einsatz sollte erfolgen, wenn der Großteil der Unkräuter das erste bis zweite Laubblatt ausgebildet haben.

### Düngung

Sommergetreidebestände, die noch nicht fertig ausgedüngt sind, sollten zu Schossbeginn die restliche N-Menge erhalten. Bei Sommerweizen sollte außerdem noch eine Qualitätsgabe eingeplant werden (Menge und Zeitpunkt an Wasserversorgung anpassen).

Achten Sie zusätzlich auf eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen. Besonders Mangan und Kupfer spielen eine wichtige Rolle. Eine Blattdüngung kann ab dem 3-Blattstadium erfolgen.

Empfehlung: PHYTAVIS Getreide Gold: 1,5-2,0 l/ha (100 g/l S, 285 g/l Mn, 105 g/l Zn, 55 g/l Cu, 18 g/l B)

Kontrollieren Sie die Bestände außerdem regelmäßig auf einen Befall mit Blattläusen. Eine Virusinfektion kann zu bedeutenden Schäden führen.

## Unkrautbekämpfung Nachauflauf (S.-Hafer, S.-Gerste und S.-Weichweizen):

### Breite Mischverunkrautung inklusive:

Gewässerabstände:  
Regelabstand  
90/75/50 %

Distel, Kamille, Klettenlabkraut, Kornblume,  
Gänsefuß / Melde, Windenknöterich

Ariane C	0,75 l/ha
+ U 46 M	1,0 l/ha

1\*  
1\*/1\*/1\*

Kamille, Klettenlabkraut, Stiefmütterchen,  
Gänsefuß / Melde

Pointer Plus	50 g/ha
+ U 46 M	1,0 l/ha

10  
1\*/5/5

Kamille, Gänsefuß / Melde, Storchschnabel, Kerbel

Potacur SX	50 g/ha
+ U 46 M	1,0 l/ha

5  
1\*/1\*/1\*

## Gräserbekämpfung Nachauflauf (S.-Gerste und S.-Weichweizen):

### Gräserbekämpfung ab 3-Blattstadium:

Windhalm, Flughafer: 0,9 l/ha Axial 50

Ackerfuchsschwanz: 1,2 l/ha Axial 50  
(Weidelgras)

Axial 50
0,9-1,2 l/ha

1\*  
1\*/1\*/1\*

Axial: nicht in Hafer

Bei Windhalm ist eine Kombination mit Ariane C oder Biathlon 4D möglich.