

Pflanzenbau-Infoservice Sommergetreide 14.04.21
Düngung und Herbizid

Die Aussaat und die Entwicklung des Sommergetreides ist, wie üblich, regional sehr unterschiedlich vorangeschritten. Sehr früh gedrückte Bestände befinden sich bereits in der Bestockung, spätere Bestände laufen gerade erst auf. Auf schweren Standorten konnte teilweise noch nicht gesät werden. Daher gilt es schlagspezifisch das richtige Timing für die kommenden Maßnahmen zu finden. Herbizidmaßnahmen sollten erfolgen, wenn der Großteil der Unkräuter das erste bis zweite Laubblatt ausgebildet haben.

Düngung

Sommergetreidebestände, die noch nicht fertig ausgedüngt sind, sollten zu Schossbeginn die restliche N-Menge erhalten. Bei Sommerweizen sollte außerdem noch eine Qualitätsgabe eingeplant werden (Menge und Zeitpunkt an Wasserversorgung anpassen).

Achten Sie zusätzlich auf eine ausreichende Versorgung mit Mikronährstoffen. Besonders Mangan und Kupfer spielen eine wichtige Rolle. Eine Blattdüngung kann ab dem 3-Blattstadium erfolgen.

Empfehlung: PHYTAVIS Getreide Gold: 2,0 l/ha (100 g/l S, 285 g/l Mn, 105 g/l Zn, 55 g/l Cu, 18 g/l B)

Kontrollieren Sie die Bestände außerdem regelmäßig auf einen Befall mit Blattläusen. Eine Virusinfektion kann zu bedeutenden Schäden führen.

Unkrautbekämpfung Nachauflauf (S.-Hafer, S.-Gerste und S.-Weichweizen):

Breite Mischverunkrautung inklusive:

Gewässerabstände:
 Regelabstand
 90/75/50 %

Distel, Kamille, Klettenlabkraut, Kornblume,
 Gänsefuß / Melde, Windenknöterich

U 46 M 1,2 l/ha
 + Ariane C 0,75 l/ha

1*
 1*/1*/1*

Kamille, Klettenlabkraut, Stiefmütterchen,
 Gänsefuß / Melde, Winden-Knöterich

Dirigent SX 30 g/ha
 + Pixxaro EC 0,3 l/ha

10
 1*/5/5

Pixxaro: nicht in Hafer

Kamille, Gänsefuß / Melde, Storchschnabel, Kerbel

Potacur SX 50 g/ha
 + U 46 M 1,2 l/ha

5
 1*/1*/1*

Ungras- und Unkrautbekämpfung Nachauflauf (S.-Gerste und S.-Weichweizen):

Gräserbekämpfung ab 3-Blattstadium:

Windhalm, Flughafer: 0,9 l/ha Axial 50

Ackerfuchsschwanz: 1,2 l/ha Axial 50
 (Weidelgras)

Axial 50
 0,9-1,2 l/ha

1*
 1*/1*/1*

Axial: nicht in Hafer

Bei Windhalm ist eine Kombination mit Ariane C oder Biathlon 4D möglich.

Hafer:

Windhalm, Kamille, Klette, Kreuzblütler,
 Vogelmiere, Melde, Taubnessel u. a.

Concert SX 100 g/ha

5
 1*/1*/5

(* = länderspez. Mindestabstand)